

PrACÉTAMINOPHÈNE INJECTION

MÉDICAMENTS INJECTABLES

L'acétaminophène injectable à 10 mg/mL est un analgésique et un antipyrétique non opioïde.

Offert en plusieurs options posologiques :

Ecoflac® plus 50 mL et 100 mL

Mini-Plasco® 10 mL

L'acétaminophène injectable est indiqué chez les adultes et les enfants de 2 ans et plus pour la prise en charge à court terme et le traitement de¹ :

- la douleur légère à modérée;
- la douleur modérée à sévère avec des analgésiques opioïdes adjuvants;
- la fièvre.

Conçu pour une administration sûre et une manipulation pratique avec Ecoflac® plus

- Ecoflac plus est un contenant à **système fermé** conçu pour prévenir la contamination microbienne².
- Ecoflac plus et Mini-Plasco ne contiennent pas de **latex de caoutchouc naturel, de polychlorure de vinyle (PVC), ni de phtalate de diéthylhexyle (DEHP)**².
- Ecoflac plus ne nécessite pas de suremballage, ce qui réduit les déchets plastiques.

Sans agent de conservation
Prêt à l'emploi
Pas de suremballage

Ecoflac® plus - Acétaminophène injectable à 1000 mg/100 mL



Ecoflac® plus - Acétaminophène injectable à 500 mg/50 mL



Mini-Plasco® - Acétaminophène injectable à 100 mg/10 mL

Pour utilisation chez les enfants

Produit	Code	DIN	Type de contenant	Dose/ Volume	Population de patients	Unité de vente
Acétaminophène injectable à 10 mg/mL	3663120	02535734	Mini-Plasco®	100 mg/ 10 mL	Enfants < 10 kg	20
Acétaminophène injectable à 10 mg/mL	3750010	02535742	Ecoflac® plus	500 mg/ 50 mL	Enfants > 10 kg et jusqu'à 33 kg	10
Acétaminophène injectable à 10 mg/mL	3750000	02535750	Ecoflac® plus	1000 mg/ 100 mL	Enfants, adolescents, adultes > 33 kg	10

Consulter la monographie du produit pour obtenir des renseignements thérapeutiques complets.

Renseignements sur le produit

Mises en garde et précautions importantes

Erreurs de médication

La prudence est recommandée lors de la prescription, de la préparation et de l'administration de l'ACÉTAMINOPHÈNE INJECTABLE pour éviter des erreurs de dosage qui peuvent entraîner un surdosage accidentel ou un décès. En particulier, s'assurer que :

- la dose en milligrammes (mg) et millilitres (mL) n'est pas confondue;
- la dose est basée sur le poids pour les patients de moins de 50 kg;
- les pompes à perfusion sont correctement programmées;
- la dose quotidienne totale d'acétaminophène provenant de toutes les voies d'administration (intraveineuse, orale et rectale) et de tous les produits contenant de l'acétaminophène (solutions orales/gouttes, sirop, comprimés, capsules, suppositoires, etc.) ne dépasse pas les limites maximales quotidiennes.

Hépatotoxicité

L'acétaminophène est associé à des cas d'insuffisance hépatique aiguë, menant parfois à une transplantation du foie ou au décès. La plupart des cas de lésions hépatiques sont associés à l'utilisation d'acétaminophène à des doses supérieures aux limites quotidiennes maximales et impliquent souvent plus d'un produit contenant de l'acétaminophène.

DOCUMENTATION

1) Acétaminophène injectable (10 mg/mL), numéro de contrôle de la présentation : 244695, monographie de produit, B. Braun du Canada Ltée, 24 février 2023.

2) Données au dossier.